

[illegible]

M.D.

[10] ■■■■CMML■■■■■■■■■■CPSS■ [11]

CMML/CPSS-mol [12]

■■■■■■■■■■the Mayo Molecular Model, MMM■■ [13] ■■■■■■■■

1■MDAPS■HGB<120 g/L■■■■■■■■■■>2.5×10⁹ /L■■■■■■■■■■IMCS■■■■■■■■■■>0%■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■≥10%■4■■■■■■■■■■1■■■■■■■■■■4■■■■■■■■■■0■1■■■■■■■■■■1■2■■■■■■■■■■2■3■■■■■■■■■■4■■■■■■■■■■

2 CPSS 6

401122345

$\mathbf{a} + 8\mathbf{q} - \mathbf{Y}$

3 CPSS-mol ASXL1 NRAS RUNX1 SETBP1 7
0 1 1 2 2 ≥3 4 CPSS-mol
0 1 1 2 2 ≥3 <5% 0 ≥5% 1 <13×10
9 / L 0 ≥13×10 9 / L 1 0 1 4 0
1 1 2 2 3 ≥4 4

■ a CPSS■+8■-7/7q-■-Y■

[illegible]

Figure 1: Schematic representation of the experimental design. The diagram shows three rows of blocks. The top row is labeled '1' and contains 10 blocks. The middle row is labeled '2' and contains 10 blocks. The bottom row is labeled '[14]' and contains 10 blocks. The blocks are represented by small squares.

[illegible][illegible]

3 ██████████ FDA ████████ MDS ██████████ CMML ██████████
 ██████████ >5% ██████████ HSCT ██████████
 ██████████ 75 mg·m⁻²·d⁻¹ █ █ 1 █ 7 ██████████ 28
 d █ █ 1 █ █ 6 ██████████ 20 mg·m⁻²·d⁻¹ █ █ 1 █ 5 ██████████ 28
 d █ █ 1 █ █ 4 ██████████

[illegible]

SCT■■■ [6] ■

■■■■■CMML■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■MDS/MPN■■■■■ [17] ■■■■■■■■■International Working Group, IWG■■■■■2006■ [6] ■■■■■■MD-CMML■■